

S1 Table. Comparative analysis of the PD-L1 (E1L3N) expression between TMA sections and whole-tumor sections

		Case No.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TMA											
Pre-TKI treatment	TC	Neg	Neg	Neg	Neg	Pos	NA	Neg	Neg	Neg	Neg
	IC	Neg	Neg	Neg	Neg	Pos	NA	Neg	Pos	Neg	Neg
Post-TKI treatment	TC	Neg	Neg	Pos	Pos	Neg	Neg	Neg	NA	Neg	Pos
	IC	Neg	Neg	Neg	Neg	Pos	Neg	Neg	NA	Neg	Neg
Whole section											
Pre-TKI treatment	TC	Neg	Neg	Neg	NA	Pos	NA	Neg	Neg	Neg	Neg
	IC	Neg	Neg	Pos	NA	Pos	NA	Neg	Pos	Neg	Neg
Post-TKI treatment	TC	Neg	Neg	Pos	Pos	Neg	Pos	Neg	NA	Neg	Pos
	IC	Neg	Neg	Neg	Neg	Pos	Pos	Neg	NA	Neg	Neg

Cut-off value of positivity: more than 1%. IC, immune cells; NA, not available; Neg, negative; PD-L1, programmed death-ligand 1; Pos, positive; TC, tumor cells; TKI, tyrosine kinase inhibitor; TMA, tissue microarray.