

Supplementary Table 11. 2세대 항정신병약물의 치료 지수*

	치료 지수	범위 (ng/mL)		좁은 치료용량범위 (<2) [†]
		하한선	상한선	
클로자핀	1.7 (600/350=1.7)	350	600	Yes
세르틴돌	2 (100/50=2)	50	100	No
리스페리돈 [‡] (팔리페리돈) [§]	3 (60/20=3)	20	60	No
아미설프라이드	3.2 (320/100=3.2)	100	320	No
아리피프라졸	3.5 (350/100=3.3)	100	350	No
올란자핀	4 (80/20=4)	20	80	No
지프라시돈	4 (200/50=4)	50	200	No
퀘티아핀	5 (500/100=5)	100	500	No

AGNP, Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie;

FDA, Food and Drug Administration; TDM, therapeutic drug monitoring.

* AGNP³⁶⁾에서 발행한 최신 전문가 협의 가이드라인⁴¹⁾을 참조했다. 본 지침서가 개정되더라도 치료지수가 안정적일 것으로 기대되는 약물만 포함하기 위해 TDM의 권고 수준이 level 1(강력히 권고됨) 혹은 level 2(권고됨) 인 2세대 항정신병약물만 포함했다.

† 공식적인 정의는 아니지만 FDA는 치료지수가 2 미만인 경우를 좁은 치료용량범위로 간주한다⁴²⁾.

‡ 리스페리돈과 9-수산화리스페리돈을 포함한다.

§ 팔리페리돈의 유효 농도 범위는 주로 리스페리돈 연구데이터를 기반으로 한 것이다.